

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 13-8-74 073900

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## EDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

55 Rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

Tél. 60-95-87 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 30 F

C. C. P. LYON 9431-17

Régisseur Avances et Recettes D. D. A.

55, Rue Mazenod — 69 — LYON-3°

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

BULLETIN n° 17

13 Août 1974

### VIGNE

BOTRYTIS - Dans l'ensemble la situation reste satisfaisante. La protection ne doit être maintenue systématiquement que dans les vignes où la maladie est déjà présente ainsi qu'en règle générale si des pluies répétées viennent à se produire.

OTIDIUM - Maintenir la protection partout où la maladie s'est manifestée.

VERS DE LA GRAPPE - L'activité de la 2ème génération est partout terminée. Un début de 3ème vol (de cochyliis principalement) se manifeste dans l'extrême sud de la région, de sorte qu'un traitement sera nécessaire dès réception (jusqu'à 4 ou 5 jours plus tard avec les produits à action en profondeur) dans les seules régions 131, 132 et 152.

### ARBRES FRUITIERS

( respecter strictement les délais de carence indiqués dans le bulletin n°6 du 4 avril 1974 )

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER - (sur pêches, poires et pommes). Maintenir la protection en toutes régions. Sur poires et pommes, choisir un produit également efficace contre le Carpocapse.

CARPOCAPSE - Maintenir la protection en toutes régions, sauf sur noyer où elle n'est plus nécessaire du fait de la lignification de la coque.

POU DE SAN JOSE - ( Zones contaminées ) - Contre la 2ème génération, utiliser lors d'un prochain traitement contre Carpocapse et Tordeuse orientale un produit également efficace contre cette cochenille, en visant la charpente comme la frondaison. Toutefois cette application ne s'impose pas avant le 25 août au nord de la latitude de Roussillon. Même si aucun bulletin n'en fait mention, nous rappelons que ce traitement doit être renouvelé au terme de 3 semaines environ.

### CULTURES DIVERSES

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE - Des traitements ne s'imposent encore que dans les régions élevées. Le défanage peut souvent en dispenser à l'approche de la récolte.

MILDIOU DE LA TOMATE - Les poussées chaudes successives de fin juillet et début août permettent de différer encore la poursuite des traitements.

### CULTURES MARAICHÈRES -

- septoriose du celeri
- alternariose de la carotte
- teigne du poireau

surveiller ces différents ennemis, et appliquer le cas échéant les conseils des bulletins n° 13 du 28 juin et n° 15 du 17 juillet.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la Circonscription : A. PITHIOUD

L'Ingénieur d'Agronomie, chargé des Avertissements agricoles : P. LATARD

Le Technicien chargé des questions maraîchères : G. FERAND

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes - Directeur-Gérant : L. BOUYX

7 1974